

Cáncer anal:

Todo lo que necesitas saber

Prevención, tratamiento y más

¿Qué es el cáncer anal?

El cáncer anal se desarrolla en los tejidos del ano y casi siempre es causado por el virus del papiloma humano (VPH), el mismo virus relacionado con el cáncer de cuello uterino y algunas verrugas anales o genitales.

¿Estoy en riesgo?

Aunque el cáncer anal es poco común en general, ciertos grupos tienen un riesgo mucho mayor.

Puedes tener un mayor riesgo si:

- ★ Vives con el VIH
- ★ Eres un hombre gay o bisexual
- ★ Eres una mujer transgénero o una persona transfemenina
- ★ Tienes antecedentes de cáncer o precáncer de cuello uterino, vulva, vagina pene
- ★ Has recibido un trasplante de órgano o tomas medicamentos que inhiben el sistema inmunitario
- ★ Tienes antecedentes de verrugas genitales o anales, o de infección por el VPH

¡NO es necesario que tengas antecedentes de sexo anal para estar en riesgo! El VPH puede transmitirse mediante cualquier contacto íntimo de piel con piel.

Buenas noticias: un importante estudio clínico demostró que detectar y tratar los signos precancerosos del cáncer anal redujo en un 57 % el riesgo de desarrollar cáncer anal.

¿Cómo puedo prevenir el cáncer anal?

- ★ Recibe la vacuna contra el VPH (pregúntale a tu proveedor si cumples los requisitos para recibirla y habla con él sobre si es adecuada para ti).
- ★ No fumes: fumar aumenta el riesgo y hace que las lesiones precancerosas sean más difíciles de tratar.
- ★ Conoce los síntomas: si tienes sangrado, picazón, dolor o un bulto cerca del ano, díselo a tu proveedor de inmediato.

¡El cáncer anal se puede prevenir y tratar si se detecta a tiempo!

¿Cómo puedo hacerme una prueba de detección?

Tu proveedor de atención primaria (PCP) puede realizar una prueba de detección en el consultorio mediante un sencillo hisopado para recoger células de la zona anal.

¿Qué pasa si se detecta algo anormal?

Las células precancerosas pueden tratarse en el consultorio con un tratamiento tópico, ablación (un tratamiento médico que elimina tejido del cuerpo mediante calor) o una intervención quirúrgica menor.

¿Cuándo debo comenzar a hacerme las pruebas de detección?

Si vives con el VIH:

- ★ Los hombres gay o bisexuales y las mujeres transgénero/personas transfemeninas deben comenzar a hacerse las pruebas de detección a los 35 años; todas las demás personas que viven con el VIH deben comenzar a los 45 años.

Si no tienes VIH:

- ★ Los hombres gay o bisexuales y las mujeres transgénero/personas transfemeninas deben hablar con su proveedor sobre las pruebas de detección alrededor de los 45–50 años.
- ★ Las personas con antecedentes de cáncer o precáncer de vulva, vagina o cuello uterino, así como quienes hayan recibido un trasplante de órgano o tengan el sistema inmunitario debilitado, deben preguntar a su proveedor sobre las pruebas de detección.

¿Tienes alguna pregunta?

Amida Care está para ayudarte.

Simplemente llama a Servicios al Socio al 1-800-556-0689, TTY 711.

Con gusto te ayudaremos.



Amida Care cumple con las leyes federales sobre derechos civiles. Amida Care no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: Language assistance services and other aids, free of charge, are available to you. Call 1-800-556-0689, TTY 711. ATENCIÓN: Dispones de servicios de asistencia lingüística y otras ayudas, gratis. Llama al 1-800-556-0689, TTY 711. 请注意：您可以免费获得语言协助服务和其他辅助服务。请致电 1-800-556-0689, TTY 711.



Department of Health

Medicaid